

Eckosil ايسكوسال

تركيبة مخليية من الأورثوسالسيك أسيد و العناصر الصغرى

سائل قابل للذوبان في الماء



التركيب:



الخصائص



٪ ١,٣٧	حديد (Fe) مصدره سلفات حديد
٪ ١,١٤	زنك (Zn) مصدره سلفات زنك
٪ ٠,٠٣	موليبدينم (Mo) مصدره مولبيدات صوديوم

٪ ٤,٢١	أورثو ساليسيليك أسيد (H_4SiO_4)
٪ ٢,٦٢	ثاني أكسيد السيليكون (SiO_2)
٪ ١,٢٣	سيليكون (Si) قابل للذوبان في الماء

Eckosil مركب من الأورثوسالسيك أسيد معزز بالحديد، الزنك و الموليبدنم. ويقوم بدورين هامين:

أولاً: زيادة امتصاص ونقل الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم و المغنيسيوم.

ثانياً: يوفر السيليكون الذي يتراكم في جدر الخلايا مما يعمل على تنظيم عملية النتح وتحمل العوامل الجوية الغير ملائمة و مقاومة الأمراض و الآفات.



رقم التسجيل

21942



المميزات:

- زيادة امتصاص العناصر الغذائية بشكل كبير، و منها المغنسيوم الذي يؤدي لزيادة نسبة الكلوروفيل.
- زيادة التحمل للضغوط البيئية كالجفاف و البرودة وخاصة الحرارة الشديدة و للوقاية من لسعات الشمس.
- تقليل شدة الهجمات من الأمراض والآفات.
- تحسين المعايير الخارجية (الوزن والتجانس والمظهر) والداخلية (نسبة السكريات، المعادن، والكربوهيدرات).
- زيادة إنتاجية المحاصيل.
- التقليل من امتصاص عنصر الصوديوم من التربة.

طريقة الاستخدام :

- لابد في حالة الخلط من التأكد من أن يكون Eckosil هو أول مركب مضاف لتخفيف pH محلول الرش



العبوات المتوفرة بها:

- عبوة : ١ لتر
- عبوة : ٥ لتر



في حالة الإستخدام للحماية من العوامل الجوية يرش ضعف الجرعة قبل الحرارة الشديدة أو الصقيع من ٢-٣ يوم.



معدل الإستخدام :



المزروعات	الرش الورقي
الفاكهة	الرشة الأولى : قبل التزهير بمعدل ٢٠٠ سم / فدان الرشة الثانية : بعد الأولي ١٥ الى ٢٠ يوم بنفس المعدل الرشات التالية : يتم إضافة رشات متعاقبة كل ٧ الى ١٤ يوم بنفس المعدل حتى الوصول لكمية ١ - ١,٥ لتر للفدان
الخضروات	الرشة الأولى : مع ظهور المجموع الخضري بمعدل ٢٠٠ سم / فدان الرشات التالية : يتم إضافة رشات متعاقبة بنفس المعدل حتى الوصول لكمية ١ - ١,٥ لتر للفدان

