

انيرماكس ENERMAX

علاق إنقسام الخلايا وتكبير الثمار

بودر قابل للذوبان في الماء



التركيب:



٣٤ %	بوتاسيوم (K_2O) مصدره مونو بوتاسيوم فوسفات - سترات بوتاسيوم
٢٠ %	فوسفور (P_2O_5) مصدره مونو بوتاسيوم فوسفات
٠,٥ %	حديد (Fe) مخلب على إيديتا
٠,٢ %	منجنيز (Mn) مخلب على إيديتا

٠,١ %	زنك (Zn) مخلب على إيديتا
٠,٠٣ %	بورون (B) مصدره بوريك أسيد
٠,٠١ %	موليبدينم (Mo) مصدره مولبيدات الصوديوم
٤ %	إيديتا

كما يحتوي على فيتامينات و أحماض أمينية و كربوهيدرات

الخصائص



ENERMAX منتج مصمم لتعزيز وتوحيد حجم الثمار، وزيادة انقسام الخلايا وإعادة توجيه العناصر من الأوراق والساق إلى الثمار. كما تم تصميمه بحيث يضمن امتصاص فوري و متزامن للعناصر الغذائية مما يلبي الإحتياجات العالية للطاقة اللازمة لنمو النبات.



رقم التسجيل

20832

المميزات:



- سماد مركب لتعزيز وتوحيد حجم الثمار.
- صمم خصيصاً لزيادة أحجام ثمار الفاكهة و الخضروات، حيث أن له دور هام في تحفيز انقسام و تكاثر الخلايا، ويعمل علي زيادة تخليق البروتينات و ضبط توزيع العناصر بين الجذور، السيقان و الأوراق.
- يوفر احتياجات النبات من الطاقة ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية لكي يساعد النبات علي تحمل ظروف الإجهاد الغير مناسبة للنمو و التي قد تؤثر علي جودة المحصول النهائي.
- عند الإستخدام المتكرر يعمل علي زيادة نشاط جميع المواد الكيميائية الحيوية والعناصر التي تدخل في نمو وتطور النبات.
- مناسب لكافة الزراعات الكثيفة وأشجار الفاكهة.

طريقة الاستخدام:



- رش ورقي
- لا بد في حالة الخلط من إجراء تجارب الخلط للتأكد من توافق المركبات

العبوات المتوفرة بها:



عبوة : ١٠٠ جرام عبوة : ١ كيلو

معدل الإستخدام:



يجب أن يكون معدل التركيز من ٧٥ - ١٢٥ جم لكل ١٠٠ لتر مياه



الرش الورقي	المزروعات
الأولي: بعد وصول قطر الحبة (٥ - ٨ مم) بمعدل ٣٠٠ جم / الفدان الثانية: بعد المعاملة الأولى بـ ١٠ أيام (قبل الحصاد بـ ٣٠ - ٣٥ يوم) بمعدل ٤٠٠ جم / الفدان	العنب يستخدم عدد (٢) معاملة
الأولي: عند وصول قطر الثمار (١٠ - ١٥ مم لليوسيفي) و (١٥ - ٢٥ مم للبرتقال) بمعدل ٣٥٠ جم / الفدان الثانية: بعد المعاملة الأولى بـ ٣٠ يوم بمعدل ٤٥٠ - ٥٠٠ جم / الفدان	الموالح يستخدم عدد (٢) معاملة
الأولي: عند وصول قطر الثمار (١٥ - ٢٠ مم) بمعدل ٢٥٠ جم / الفدان الثانية: بعد المعاملة الأولى بـ ٤٠ - ٤٥ يوم بمعدل ٣٥٠ جم / الفدان	المانجو يستخدم عدد (٢) معاملة
الأولي: عند وصول قطر الثمار (٢٥٠ - ٣٠٠ مم) بمعدل ٢٥٠ جم / الفدان الثانية: بعد المعاملة الأولى بـ ١٥ يوم بمعدل (٣٥٠ - ٤٥٠ مم) جم / الفدان	الخوخ يستخدم عدد (٢) معاملة
عند وصول قطر الثمار (١٠ - ١٥ سم للبطيخ) و (٧ - ٨ سم للكتالوب) بمعدل ٢٥٠ - ٣٥٠ جم / الفدان	البطيخ - الكنتالوب
الأولي: بعد التبريض بمعدل (٦٠٠ - ٨٥٠ مم) جم / الفدان الثانية: قبل الحصاد بـ ٢٠ يوم بنفس المعدل	البطاطس يستخدم عدد (٢) معاملة
يتم الرش عندما تكون الثمار بين اللون الأبيض والوردي بالتزامن مع ارتفاع نسبة نمو الثمار بمعدل ٢٥٠ جم / الفدان و يمكن الأضافة حقناً مع ماء الري بمعدل ٤٠٠ جم / الفدان ويمكن تكرار المعاملة كل أسبوعين عند الحاجة	الفراولة

